


WEST NILE DISEASE

La West Nile Disease (WND), è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso attraverso la puntura di zanzara a mammiferi, uccelli, rettili. In rari casi l'uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone.



REGIONE CAMPANIA

TRASMISSIONE DEL VIRUS



IL VIRUS PUÒ
ESSERE TRASMESSO
ALL'UOMO SOLO
DALLA ZANZARA
O DA EMODERIVATI



SINTOMI NELL'UOMO

80%

NESSUN SINTOMO

20%

MALATTIA SIMIL-INFLUENZALE (FEBBRE, MAL DI TESTA, NAUSEA, VOMITO, LINFONODI INGROSSATI, SFOGHI CUTANEI)

-1%

SINTOMI NEUROLOGICI. NELLO 0,6% DEI CASI, IL VIRUS PROVOCA GRAVI FORME NEUROLOGICHE (ENCEFALITE, MENINGOENCEFALITE O PARALISI FLACCIDA)

PREVENZIONE



Coprire le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere



All'aperto utilizzare repellenti contro gli insetti



Trattare con prodotti larvicidi, ogni 15 giorni circa, tombini e pozzetti di sgrondo delle acque piovane, zone di scolo e ristagno



Schermare porte e finestre con zanzariere



Eliminare da stabili e abitazioni eventuali ripari dove possono annidarsi volatili infetti



Rimuovere fonti di acqua stagnante. Cambiare spesso l'acqua delle ciotole per animali



Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite



Tenere le piscine per i bambini vuote e coperte quando non sono in uso

COSA FARE??

SE HAI UNO DEI SINTOMI SOPRA MENZIONATI RIVOLGITI AL TUO MEDICO O PEDIATRA .
SE RINVIENI VOLATILI MORTI CHIAMA AL NUMERO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE:

C.Re.San
CENTRO DI INTERVENTO REGIONALE SANITÀ PUBBLICA

800232525



se trovi uno di questi uccelli ferito o morto contatta il servizio veterinario della ASL

Numero verde: 800232525

cornacchie, corvi, ghiandaie, storni, merli, gazze, falchi, falchetti, gufi, allocchi, civette barbagianni, rondini, rondoni..



Diventerai così parte attiva nella **SORVEGLIANZA** per la **WEST NILE DESEASE**

Il primo modo per difendersi è ridurre il numero di vettori in circolazione:

negli **spazi privati** il cittadino o gli amministratori di condominio devono **SISTEMATICAMENTE** eliminare tutte le raccolte di acqua stagnante che rappresentano l'ambiente di ovodeposizione della zanzara (focolai larvali):

- secchi o altri contenitori, grondaie, sottovasi, abbeveratoi per animali, pneumatici o altro materiale accantonato ed altro dove possa ristagnare acqua, ogni 3/4gg o, devono essere svuotati o, quando non possibile, trattati con larvicidi.
- le piscine non in uso devono essere coperte
- gli spazi verdi devono essere periodicamente puliti ed il materiale di sfalcio non accumulato in zone esposte

negli **spazi pubblici** le Amministrazioni Comunali:

- i cantieri, le aree dismesse, i piazzali di deposito, i parcheggi, i vivai, gli orti urbani ma anche nelle attività produttive e commerciali devono essere sgomberati da materiale abbandonato ove possa ristagnare acqua;
- tombini e caditoie, ma anche fontane, laghetti, grondaie o altri ristagni d'acqua presenti in parchi, giardini e cimiteri devono essere periodicamente puliti e liberati da raccolte di acqua stagnante
- i potenziali focolai larvali che non possono essere trattati con misure gestionali devono essere periodicamente trattati con larvicidi

Come prevenire le punture di zanzare

Prevenzione

Dal momento che ad oggi non sono disponibili vaccini o terapie preventive, l'unico modo per evitare l'infezione è prevenire la puntura delle zanzare, prestando particolare attenzione nelle ore serali/notturne.

Ecco alcuni suggerimenti:



- indossa **abiti di colore chiaro** che coprano la maggior parte del corpo;



- proteggiti durante il sonno dotando il tuo **letto** di una **zanzariera**;



- usa **repellenti cutanei** sulla pelle esposta, seguendo attentamente le indicazioni riportate nella confezione. Chiedi al tuo farmacista qual è il prodotto più adatto alle tue esigenze;



- in casa utilizza spray a base di piretro e altri insetticidi per uso domestico oppure diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi e seguendo attentamente le istruzioni per l'uso;



- proteggi la tua casa con zanzariere a porte e finestre;
- elimina l'acqua stagnante da sottovasi, secchi, bidoni, ciotole per animali, piscine inutilizzate, per impedire la proliferazione delle zanzare;



- proteggiti durante le attività all'aperto nel tardo pomeriggio, soprattutto lungo i corsi d'acqua e i canali, le visite ai cimiteri, lavori negli orti, ecc.

WEST NILE



Nessun contagio diretto tra uomo e uomo: il virus si trasmette solo tramite i vettori (zanzare) .

Nella maggior parte dei casi l'infezione è asintomatica o causa sintomi lievi come:

- Febbre
- Mal di testa
- Nausea
- Vomito



La sintomatologia regredisce in breve tempo Non occorre il ricovero ospedaliero

Vanno protetti:

- Persone anziane
- Persone con disturbi immunitari
- Persone con patologie croniche (tumori diabete ipertensione malattia renale)
- Persone sottoposte a trapianto

Se dopo una puntura di zanzara compare febbre alta e mal di testa associate a:

- rigidità del collo
- stato stuporoso
- disorientamento
- tremori
- convulsioni
- debolezza muscolare
- perdita della vista
- intorbidimento
- paralisi

rivolgeti immediatamente al medico o recati in una struttura ospedaliera